

4.9375"

3.5625"

5.1875"

ORTHO®

NUTSEGE KILLER

FOR LAWNS

ELIMINADOR DE JUNCIAS PARA CESPEDES

READY-TO-SPRAY

**KILLS YELLOW & PURPLE
NUTSEGE, KYLLINGA, &
Over 50 Other Tough Weeds**

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See other panels for additional
precautionary information.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCION Vea los demás paneles para conocer
más información de precaución.

Active Ingredient:

Sulfentrazone 1.40%

Other Ingredients 98.60%

Total 100.00%


Contains 0.000926 pounds of active
ingredient per fluid ounce of product.

FPO

LB2362

NET CONTENTS / CONTENIDO NETO 32 FL OZ (946 mL)

3.8125"



2.6875"

2.6875"

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Observe all cautions and limitations on this label. The use of **Ortho® Nutsedge Killer for Lawns Ready-To-Spray** not consistent with this label may result in plant injury. Keep container closed to avoid spills and contamination. Do not spray ornamentals, flowers or vegetable beds. For optimum control of some weeds, repeat application may be needed. Keep children and pets out of the treated area until sprays have dried.

PRODUCT USAGE

KILLS	Sedges and Broadleaf Weeds: Purple and Yellow Nutsedge, Kyllinga, Plantain, Clover, Spurge, Woodsorrel, Knotweed, Chickweed, Curly Dock, Wild Onion, Wild Garlic, and other listed weeds.
USE ON	Well established turf grasses. Cool Season Grasses: Creeping Bentgrass, Fine & Tall Fescue, Perennial Ryegrass, Kentucky & Rough Bluegrass Warm Season Grasses: Bahiagrass, Bermudagrass, Buffalograss, Carpetgrass, Centipedegrass, Kikuyugrass, Seashore Paspalum, St. Augustinegrass, Zoysiagrass
AMOUNT TO USE	Apply at the rate of 1 quart of Ortho® Nutsedge Killer for Lawns Ready-To-Spray to cover 5,000 sq ft. See label for additional instructions.
WHEN TO USE	As weeds are small and actively growing. Wait 1 month after application before re-seeding.

USE INFORMATION

Ortho® Nutsedge Killer for Lawns Ready-To-Spray selectively controls tough weeds like purple and yellow nutsedge (nutgrass), kyllinga, wild onion and garlic, broadleaf plantain, purslane, redroot pigweed, dandelion, spurge, and other listed annual, biennial, and perennial broadleaf weeds in a great variety of lawns, including:

Cool Season Grasses

Creeping Bentgrass
Tall Fescue
Fine Fescue
Kentucky Bluegrass

Rough Bluegrass
Ryegrass (perennial)

Warm Season Grasses

Bermudagrass
St. Augustinegrass
Zoysiagrass
Carpetgrass
Centipedegrass
Buffalograss
Bahiagrass
Kikuyugrass
Seashore Paspalum

APPLICATION RESTRICTIONS AND PRECAUTIONS

For best results, apply to weeds when less than 3 inches high. Wait at least 4 weeks after treatment before reseeding, winter overseeding, or plugging lawns.

Avoid applying when windy to prevent product drifting to other plants.

Try to avoid overlap spraying.

Do not apply to newly planted, plugged, or sodded turfgrass.

Do not spray over-the-top of flowers, ornamentals (including herbaceous) or garden vegetables as injury may result.

Do not use on turfgrasses other than those listed on the label.

Do not use in greenhouses.

Do not graze or feed treated grass clippings.

Do not apply more than 9.3 fl oz of product per 1000 sq ft per year.

Use only on well established non-stressed turfgrass. Applications to stressed plant (turfgrass or target weeds) may result in temporary discoloration or poor weed control. Allow turfgrass to develop good root system before applying. If discoloration occurs, treated turfgrass will recover with new growth and discolored leaf tissue will be removed with mowing. To reduce potential for discoloration, do not apply **Ortho® Nutsedge Killer for Lawns Ready-To-Spray** on turfgrass that is weakened by weather, mechanical, chemical, disease or other related stress. Maintain proper cultural practices such as adequate moisture and fertility levels to promote healthy turfgrass growth.

HOW TO USE READY-SPRAY® II SYSTEM**CONNECT**

- Shake well before using.
- Connect sprayer to hose.
- Turn on water.
- Extend hose to farthest area of the measured area to be treated.

SPRAY

- To begin spraying, disengage safety lock and point nozzle in the direction you want to spray.
- Slide thumb activation switch forward to **ON** position.
- Spray evenly over measured area.

FINISH

- To **STOP** spraying, slide thumb activation switch backward to **OFF** position.
- Turn off water.
- Relieve water pressure by sliding thumb switch to **WATER ONLY** position until water slows to a drip. Then, slide switch back to **OFF** position and engage safety lock.
- Disconnect sprayer from hose.

3


4.8125"

5.1875"

3.125"

3.125"

BOOK IN



2.6875"

2.6875"

4.8125"

5.1875"

Mallow, common	(<i>Malva neglecta</i>)
Parsley piert	(<i>Aphanes microcarpa</i>)
Pennywort (Dollarweed)	(<i>Hydrocotyle spp.</i>)
Pigweed, Redroot	(<i>Amaranthus retroflexus</i>)
Pigweed, Smooth	(<i>Amaranthus hybridus</i>)
Pigweed, Tumble	(<i>Amaranthus albus</i>)
Pineapple weed	(<i>Matricaria matricarioides</i>)
Plantain Broadleaf	(<i>Plantago major</i>)
Plantain, Buckhorn	(<i>Plantago lanceolata</i>)
Plantain, Narrow leaf	(<i>Plantago narowiforma</i>)
Puncturevine	(<i>Tribulus spp.</i>)
Purslane, common	(<i>Portulaca oleracea</i>)
Pusley, Florida	(<i>Richardia scabra</i>)
Redweed	(<i>Melochia corchorifolia</i>)
Rocket, London	(<i>Sisymbrium irio</i>)
Smartweed, Pennsylvania	(<i>Polygonum pensylvanicum</i>)
Sorrel, Red	(<i>Rumex acetosella</i>)
Speedwell	(<i>Veronica spp.</i>)
Spurge (annuals)	(<i>Euphorbia spp.</i>)
Spurge, prostrate	(<i>Euphorbia humistrata</i>)
Spurge, spotted	(<i>Euphorbia maculata</i>)
Star-of-Bethlehem	(<i>Ornithogalum umbellatum</i>)
Velvetleaf	(<i>Abutilon theophrasti</i>)
Violet, wild	(<i>Viola spp.</i>)
Wild garlic	(<i>Allium vineale</i>)
Wild onion	(<i>Allium canadense</i>)
Woodsorrel, creeping	(<i>Oxalis corniculata</i>)
Woodsorrel, yellow	(<i>Oxalis stricta</i>)

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE

Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal. Store in a cool, dry area, preferably in a locked storage area and avoid excess heat. Keep from freezing. Do not store below 32°F. Always store pesticides in the original container. Store away from food and pet food. Keep out of reach of children and animals. After partial use, replace lids and close tightly. Do not put concentrate or dilute material into drink containers.

PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING

Nonrefillable container. Do not use or refill this container.
If empty: Place in trash or offer for recycling if available.
If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

FIRST AID

IF SWALLOWED

- Call poison control center or doctor immediately for treatment advice.
- Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor.
- Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF ON SKIN OR CLOTHING

- Take off contaminated clothing.
- Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF IN EYES

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.

5/9/12 SSL move contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then
 Page 1 of 10 continue rinsing eye.


- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

HOTLINE NUMBER

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. You may also contact 1-800-225-2883 for emergency assistance.

3.125"

3.125"



2.6875"

2.6875"

INFORMACION DE USO

El **Eliminador juncias para céspedes Ortho® listo para rociar** controla selectivamente malezas resistentes, como juncia real y juncia avellanada, kyllinga, cebolla y ajo silvestre, llantén mayor, verdolaga, yuyo de raíces coloradas, diente de león, bledo, y otras malezas anuales y bienales de hoja ancha especificadas a continuación en una gran variedad de céspedes, como:

Pastos de estación templada

Agrostis palustris
Festuca alta
Festuca fina
Hierba azul de Kentucky

Pastos de estación cálida

Césped Bermuda
Césped San Agustín
Césped zoysia
Césped alfombra
Césped ciempiés

RESTRICCIONES Y PRECAUCIONES EN LA APLICACION

Para obtener los mejores resultados, aplique en las malezas cuando tengan menos de 7.6 cm de altura.

Espere, al menos, 4 semanas después del tratamiento antes de volver a sembrar, hacer sobresiembras de invierno o sembrar cepellones de césped.

Evite aplicar el producto cuando haga viento para evitar que el producto se desvíe y caiga sobre otras plantas.

Trate de evitar superposición del rociado.

No aplique sobre césped recién plantado, en el que se hayan plantado cepellones o recién fijado.

No rocíe sobre flores, plantas ornamentales (incluso plantas herbáceas) o verduras de huerta dado que podría dañarlas.

No aplique sobre céspedes que no estén enumerados en la etiqueta.

No utilice el producto en invernaderos.

No utilice recortes tratados como alimento para animales.


No aplique más de 275 ml del producto en 93 m² por año.

10

Utilice solamente en céspedes bien establecidos y sin daños o desgastes. La aplicación del producto a plantas con desgastes (césped o malezas que son el objetivo de tratamiento) puede resultar en una decoloración temporal o un control pobre de las malezas. Permita que el césped desarrolle un buen sistema de raíces antes de aplicar el producto. Si ocurre decoloración, el césped tratado se recuperará con el crecimiento de los brotes nuevos, y las hojas decoloradas pueden removerse al cortar el césped. Para reducir el riesgo de decoloración, no aplique el **Eliminador de juncias para céspedes de Ortho® Listo para Usar** en céspedes que estén debilitados por el clima, enfermedades o por daños químicos, mecánicos u otros. Mantenga prácticas culturales apropiadas, tales como humedad y niveles de fertilidad adecuados, para promover el crecimiento saludable del césped.

COMO UTILIZAR EL SISTEMA READY-SPRAY® II

CONECTAR



- Agite bien antes de usar.
- Conecte el rociador a la manguera.
- Abra el paso de agua.
- Extienda la manguera al área más distante de la superficie medida que se tratará.

ROCIAR



- Para comenzar a rociar, quite el seguro y apunte la boquilla en la dirección en la que desee aplicar el producto.
- Deslice la palanca de activación con el pulgar hacia adelante a la posición "ON" (encendido).
- Rocíe uniformemente sobre la superficie medida.

FINALIZAR



- Para **DETENER** el rociado, deslice la palanca de activación con el pulgar hacia atrás a la posición "OFF" (apagado).
- Cierre el paso de agua.
- Para disminuir la presión de agua, deslice la palanca con el pulgar a la posición "WATER ONLY" (agua únicamente) hasta que la salida del agua se convierta en un goteo. Luego, deslice la palanca de regreso a la posición "OFF" (apagado) y active el seguro.
- Desconecte el rociador de la manguera.

11

4.8125"

5.1875"

3.125"

3.125"

2.6875"

2.6875"

4.8125"

5.1875"

CONTROL DE JUNCIAS (COMO JUNCIA AVELLANADA Y JUNCIA REAL)

Rocíe directamente sobre los brotes de las malezas para controlar o suprimir las juncias. El **Eliminador de juncias para céspedes Ortho® listo para rociar** es efectivo contra juncias recién brotadas y establecidas. Se requiere una buena cobertura de rocío para un control óptimo.

Especies de juncias controladas o suprimidas

Nombre común	Nombre científico
Kyllinga, verde	(<i>Kyllinga brevifolia</i>)
Kyllinga, verde falso	(<i>Kyllinga gracillima</i>)
Juncia real*	(<i>Cyperus rotundus</i>)
Juncia avellanada	(<i>Cyperus esculentus</i>)
Juncia globe	(<i>Cyperus globulosus</i>)
Juncia cilíndrica	(<i>Cyperus retrorsus</i>)
Juncia de Surinam	(<i>Cyperus surinamensis</i>)
Juncia de Texas	(<i>Cyperus polystachyos</i>)

*Para un control óptimo de la juncia real, aplique el **Eliminador de juncias para céspedes Ortho® listo para rociar** como tratamiento focalizado según sea necesario.

CONTROL DE MALEZAS DE HOJA ANCHA ANUALES, BIENALES Y PERENNES

Rocíe directamente sobre los retoños de las malezas para controlar o suprimir una amplia gama de malezas de hoja ancha.

Malezas de hoja ancha controladas o suprimidas por el Eliminador de juncias para céspedes Ortho® listo para rociar

Hojas anchas	Nombre científico
Berro amargo	(<i>Cardamine spp.</i>)
Alfalfa lupulina	(<i>Medicago lupulina</i>)
Ranúnculo	(<i>Ranunculus spp.</i>)
Geranio de Carolina	(<i>Geranium carolinianum</i>)
Verdolaga alfombra	(<i>Mollugo verticillata</i>)

Álsine común	(<i>Stellaria media</i>)
Potentilla	(<i>Potentilla spp.</i>)
Trébol	(<i>Trifolium spp.</i>)
Siempreviva	(<i>Gnaphalium spp.</i>)
Diente de león	(<i>Taraxacum officinale</i>)
Romaza	(<i>Rumex crispus</i>)
Primavera nocturna	(<i>Oenothera spp.</i>)
Amsinckia ("Fiddleneck")	(<i>Amsinckia spp.</i>)
Alfilerillo (<i>Erodium cicutarium</i>)	(<i>Erodium spp.</i>)
Vara de oro	(<i>Solidago spp.</i>)
Hiedra terrestre	(<i>Glechmea hederacea</i>)
Ortiga mansa	(<i>Lamium amplexicaule</i>)
Cien nudos	(<i>Polygonum aviculare</i>)
Pinillo	(<i>Kochia scoparia</i>)
Cenizo blanco común	(<i>Chenopodium album</i>)
Cadillo	(<i>Soliva pterisperma</i>)
Lespedeza común	(<i>Lespedeza striata</i>)
Malva común	(<i>Malva neglecta</i>)
Alquimila arvense	(<i>Aphanes microcarpa</i>)
Acaricoba (Pennywort)	(<i>Hydrocotyle spp.</i>)
Yuyo de raíces coloradas	(<i>Amaranthus retroflexus</i>)
Bledo	(<i>Amaranthus hybridus</i>)
Bledo blanco	(<i>Amaranthus albus</i>)
Piñas de algas	(<i>Matricaria matricarioides</i>)
Llantén mayor	(<i>Plantago major</i>)
Llantén menor	(<i>Plantago lanceolata</i>)
Plántago menor	(<i>Plantago narrowiforma</i>)
Abrojo	(<i>Tribulus spp.</i>)
Verdolaga	(<i>Portulaca oleracea</i>)

13

3.125"

3.125"

2.6875"

2.6875"

4.8125"

5.1875"

Ipecacuana blanca	(<i>Richardia scabra</i>)
Maleza roja	(<i>Melochia corchorifolia</i>)
Matacandil	(<i>Sisymbrium irio</i>)
Persicaria pensilvánica	(<i>Polygonum pensylvanicum</i>)
Amargosa	(<i>Rumex acetosella</i>)
Verónica	(<i>Veronica spp.</i>)
Bledo (anuales)	(<i>Euphorbia spp.</i>)
Bledo rastrero	(<i>Euphorbia humistrata</i>)
Yerba de la golondrina	(<i>Euphorbia maculata</i>)
Estrella de Belén	(<i>Ornithogalum umbellatum</i>)
Abutilón	(<i>Abutilon theophrasti</i>)
Violeta silvestre	(<i>Viola spp.</i>)
Ajo silvestre	(<i>Allium vineale</i>)
Cebolla silvestre	(<i>Allium canadense</i>)
Vinagrillo	(<i>Oxalis corniculata</i>)
Oxalis amarillo	(<i>Oxalis stricta</i>)

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA

No contamine el agua, los alimentos o el forraje al almacenar o eliminar. Almacene el producto en un lugar fresco y seco, preferentemente en un área de almacenamiento bajo llave, y evite el calor excesivo. Evite que el producto se congele. No almacene el producto a temperaturas inferiores a 0 °C. Siempre almacene pesticidas en su envase original. Mantenga el pesticida lejos de comestibles y alimentos para mascotas. Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales. Luego del uso parcial del producto, vuelva a colocar la tapa y cierre con firmeza. No coloque el producto concentrado o diluido en envases de bebidas.

ELIMINACION DE PESTICIDAS Y MANEJO DEL ENVASE

Envase no rellenable. No vuelva a utilizar ni a llenar este envase.

Si está vacío: Colóquelo en la basura o reciclelo, si corresponde.

Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia de desechos sólidos local para obtener instrucciones sobre cómo eliminar el producto. Nunca elimine el producto no utilizado en drenajes interiores o exteriores.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INGERIR EL PRODUCTO

- Consulte a un médico o a un centro de control de envenenamientos inmediatamente para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.
- No induzca el vómito a menos que así se lo indique un médico o un centro de control de envenenamientos.
- No administre nada por boca a una persona que haya perdido el conocimiento.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA

- Quítese la ropa contaminada.
- Lave inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos.
- Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

SI EL PRODUCTO ENTRA EN LOS OJOS

- Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos.
- Si usa lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos.
- Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

NUMERO DE LINEA DIRECTA

Tenga el envase o la etiqueta del producto con usted cuando llame al centro de control de envenenamiento o al médico, o vaya por tratamiento. También puede llamar al 1-800-225-2883 para obtener atención de emergencia.

14

15

3.125"

3.125"

BASE LABEL

